

**Pétrographie, minéralogie et géochimie des roches lamproïtiques du Kef
Hahouner (Nord-Est algérien)**

Mohamed Yacine LAGHOUAG¹, Moulley Charaf CHABOU¹, Gaston GODARD²,

*¹Département des Sciences de la Terre, Institut d'Architecture et des Sciences de la Terre, Université Ferhat
Abbas, Sétif. charaf.chabou@univ-setif.dz. ²Institut de physique du Globe, Sorbonne Paris Cite, Université
Paris-Diderot, UMR 7154 CNRS, 1, rue Jussieu, 75238 Paris cedex 05, France.*

Des roches de nature lamproïtique ont été signalées dans le Nord-Est algérien, près du Kef Hahouner et de la Koudiat el Anzazza, mais très peu d'études leur ont été consacrées. Nous avons réalisé des études pétrographique, minéralogique et géochimique, ainsi que des études sur le terrain des roches du massif volcanique du Kef Hahouner. Ces roches affleurent sous forme de coulées au sein du Miocène continental du bassin de Constantine. Les études pétrographique, minéralogique et géochimique indiquent l'existence de deux types de roches : des roches lamproïtiques à la base, et des shoshonites au sommet. Ces deux types de roches sont séparés par un niveau du Miocène continental rouge. Les roches lamproïtiques sont composées de phénocristaux d'olivines (Fo₇₂ à Fo₈₇) dans une mésostase composée de sanidine dont le cœur est riche en baryum, de clinopyroxène (Wo₄₃En₄₆Fs₁₁), plagioclase (labrador, An₅₀₋₆₅), apatite, phlogopite et verre. Les minéraux opaques sont composés de spinelles chromifères et titanifères, souvent en inclusion dans l'olivine. Les minéraux d'altérations sont essentiellement composés de chlorophaite et de bowlingite. D'un point de vue géochimique, les roches lamproïtiques sont ultrapotassiques (K₂O/Na₂O > 2 ; K₂O > 3% et MgO > 3) à [Mg] élevé ([Mg] = Mg/(Mg+Fe²⁺)) autour de 0,71, ce qui est caractéristiques de roches primitives. Les spectres des terres rares normalisés aux chondrites de ces roches présentent un enrichissement important en terres rares légères (LREE) par rapport aux terres rares lourdes (HREE) et le diagramme multi-éléments normalisé au manteau primitif montre un extrême enrichissement en terres rares légères (LREE) et autres éléments lithophiles à grands rayons ioniques (LILE : Cs, Ba, Rb, Th et U) avec des teneurs jusqu'à 3000 fois supérieures à celle du manteau primitif. Les shoshonites sont composées de lattes de plagioclases (labrador, An₆₀₋₇₀) dans une mésostase composée de sanidine riche en baryum, de clinopyroxène (Wo₄₅En₄₂Fs₁₄), apatite et ilménite. De gros cristaux de calcite occupent souvent les vacuoles de la roche ou remplacent un minéral ferro-magnésien,

probablement de l'olivine. Les shoshonites montrent un spectre des terres rares normalisés aux chondrites et un diagramme multi-éléments normalisé au manteau primitif semblable à ceux des roches lamproïtiques mais avec des teneurs en LREE et LILE moins importantes. Les spectres des terres rares et multiéléments des roches lamproïtiques du Kef Hahouner sont identiques à ceux des lamproïtes du bassin méditerranéen, ce qui indique une même affinité pétrographique et une origine commune. Une subduction à vergence sud suivie d'une délamination post-collisionnelle est peut-être responsable du volcanisme lamproïtique et shoshonitique dans cette partie des Maghrébides.

Mots clés : Lamproïtes – Shoshonites – Kef Hahouner – Pétrographie - Géochimie.